

Goñy González Wendy Angélica¹

Rivas Espinosa Juan Gabriel²

¹Universidad Nacional Autónoma de México/Programa de Maestría en Enfermería/México,
D.F./gogowean@hotmail.com

²Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco/Coordinación de licenciatura en Enfermería/México,D.F./jrivas@correo.xoc.unam.mx

Determinantes Sociales de la Salud y su asociación con la Ideación Suicida en estudiantes adolescentes.

Introducción: El suicidio, un fenómeno universal, complejo y multifactorial que se ha incrementado en las últimas décadas; representa la tercer causa de mortalidad en los adolescentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para el 2020, 1.53 millones de personas morirán por suicidio. Lo que representa un suicidio cada 20 segundos y un intento suicida cada 2 segundos; resulta necesario analizar la asociación entre los Determinantes Sociales de la Salud Intermediario (DSS-I) y el riesgo de Ideación Suicida (R-IS) en adolescentes. **Objetivo:** Conocer la asociación entre los DSS-Intermediarios y el riesgo de IS en adolescentes. **Material y métodos:** Estudio descriptivo, transversal, correlacional con 800 adolescentes estudiantes de una escuela secundaria mexicana; evaluando los DSS-Intermediarios en 4 dimensiones: salud, escuela, familia, vivienda y el riesgo de IS a través de un instrumento con escala de respuesta tipo lickert, un Alfa de Cronbach .979. **Resultados:** Existe relación lineal moderada y directamente proporcional, entre los DSS-Intermediarios y el nivel de riesgo IS ($r_s=.808$, $p=.000$). El 7% de los adolescentes se ubico en Alto Riesgo de IS, 39% Moderado y 54% Bajo, la media mayor en relación al sexo fue en mujeres que en hombres (15.17/12.52). El porcentajes de DSS-intermediarios por dimensión, ubico a la Familia (42%), Vivienda (35%), Escuela (39%), Salud (51%) como coadyuvantes en el riesgo IS. **Conclusiones:** Existe asociación entre los DSS-Intermediarios y el nivel del riesgo de IS en adolescentes estudiantes de secundaria. **Palabras claves:** Determinantes Sociales de la Salud; Riesgo de Ideación Suicida; Adolescentes; Estudiantes de Secundaria.

Social Determinants of Health and its association with Suicidal Ideation in adolescent students.

Introduction: Suicide, a universal, complex and multifactorial phenomenon that has increased in recent decades; It represents the third cause of mortality in adolescents. The World Health Organization (WHO) estimates that by 2020, 1.53 million people will die by suicide. What represents a suicide every 20 seconds and a suicide attempt every 2 seconds; It is necessary to analyze the association between the Social Determinants of Intermediary Health (DSS-I) and the risk of Suicidal Ideation (R-IS) in adolescents. **Objective:** To know the association between the DSS-Intermediaries and the risk of IS in adolescents. **Material and methods:** Descriptive, transversal, correlation study with 800 adolescent students of a Mexican secondary school; evaluating the DSS-intermediary in 4 dimensions: health, school, family, housing and the risk of IS through an instrument with a response scale type lickert, a Cronbach Alpha .979. **Results:** There is a moderate and directly proportional linear relationship between the DSS-Intermediaries and the IS risk level ($r_s = .808$, $p = .000$). 7% of adolescents were in High Risk of IS, 39% Moderate and 54% Low; the highest average in relation to sex was in women than in men (15.17 / 12.52). The percentages of DSS-intermediaries by dimension, place the Family (42%), Housing (35%), School (39%), Health (51%) as coadyuban in the IS risk. **Conclusions:** There is an association between

DSS-Intermediaries and the level of IS risk in adolescent high school students. **Keywords:** Social Determinants of Health, Risk of Suicidal Ideation, Adolescents, Secondary Students